

Keskkonnaministri 26. mai  
.2005. a määruse nr 45  
"Kiirgustöötaja ja elaniku  
efektiivdooside seire ja  
hindamise kord ning  
radionukliidide sissevõtt  
põhjastatud dooside  
doosikoefitsientide ning kiirgus-  
ja koefaktori väärtused"  
lisa 3

Eri kudede või elundite koefaktori  $W_C$  väärtused<sup>1</sup>

Kude või elund	Koefaktor $W_C$
Sugunäärmed	0,20
Luuüdi	0,12
Käärsool	0,12
Kops	0,12
Magu	0,12
Põis	0,05
Rinnad	0,05
Maks	0,05
Söögitoru	0,05
Kilpnääre	0,05
Nahk	0,01
Luuümbris	0,01
Muu <sup>2</sup> : neerupealsed näärmad, aju, jämesoole ülaosa, peensool, neerud, lihased, kõhunääre (pankreas), põrn, harknääre (tüümus) ja emakas	0,05

<sup>1</sup> Kiirgustöötaja ja elaniku koefaktori väärtused on ühesugused.

<sup>2</sup> Kui mistahes Muu hulka arvatud üksikkoe või -elundi ekvivalentdoos ületab tunduvalt ükskõik millise tabelis koefaktoriga määratletud koe või elundi maksimaalse doosi, võrdsustatakse vastava koe või elundi koefaktor 0,025 ja ülejäänud Muu koefaktoriga 0,025.