

Põllumajandusministri 24. aprilli
2006. a määruse nr 53 "Õli- ja
kiudtaimede seemne kategooriad
ning õli- ja kiudtaimede seemne
tootmise ja turustamise nõuded¹"
Lisa 6

SEEMNE KVALITEETI ALANDAVATE TAIMEKAHJUSTAJATE PIIRMÄÄRAD

Järjekorra number	Liik	Taimehaigus	Taimehaigusega saastunud seemnete maksimumprotsent	(<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
		hahkhallitus	(maksimaalne	
		(<i>Botrytis</i> spp.)	(<i>Alternaria</i> spp.),	sklerootsiumide
		spp.)	laikpõletik(<i>Ascochyta</i>	või nende osade
			<i>linicola</i> syn. <i>Phoma</i>	arv)
			<i>linicola</i>), linakõrbus (
			<i>Colletotrichum lini</i>),	
			lina-närbumistõbi	
			(<i>Fusarium</i> spp.)	
1.	Raps <i>Brassica napus</i> L. (partim)			10 ¹
2.	Rüps <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.)			5 ¹
3.	Briggs Harilik kanep <i>Cannabis sativa</i> L.	5		
4.	Päevalill <i>Helianthus annuus</i> L.	5		
5.	Harilik lina <i>Linum usitatissimum</i> L. (partim)	5	5 ²	
6.	Valge sinep <i>Sinapis alba</i> L.			5 ¹

¹ valgemädaniku (*Sclerotinia sclerotiorum*) sklerootsiumide arvu või nende osade arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas 5. veerus sätestatud nõuded on täidetud.

² hariliku lina puhul ei tohi lina laikpõletikuga (*Ascochyta linicola* syn. *Phoma linicola*) saastatud seemnete arv olla suurem kui üks.