

### SEEMNE KVALITEETI ALANDAVATE TAIMEKAHJUSTAJATE PIIRMÄÄRAD

Järjekorra number	Liik	Taimahaigus		
		Taimehaigusega saastunud seemnete maksimumprotsent (veerus kokku)		<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (maksimaalne sklerootsiumide või nende osade arv lisa 5 veerus 5 märgitud kaaluga proovis)
		hahkhallitus ( <i>Botrytis</i> spp.)	kuivlaiksus ( <i>Alternaria</i> spp.), laikpõletik ( <i>Phoma exigua</i> var. <i>linicola</i> ), linakõrbus ( <i>Colletotrichum linicola</i> ), linanärbumistõbi ( <i>Fusarium</i> spp.)	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Raps ( <i>Brassica napus</i> L. (partim))			10 <sup>2</sup>
2.	Rüps ( <i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs)			5 <sup>2</sup>
3.	Harilik kanep ( <i>Cannabis sativa</i> L.)	5		
4.	Harilik lina ( <i>Linum usitatissimum</i> L. (partim))	5	5 <sup>1</sup>	
5.	Valge sinep ( <i>Sinapis alba</i> L.)			5 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> hariliku lina puhul ei tohi lina laikpõletikuga (*Phoma exigua* var. *linicola*) saastunud seemnete arv olla suurem kui üks.

<sup>2</sup> valgemädaniku (*Sclerotinia sclerotiorum*) sklerootsiumide või nende osade arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas veerus 5 kehtestatud tingimused on täidetud.

Ants Noot  
 Kantsler