

IMMUNISEERIMISKAVA

Vanus	Vaktsiini tähis ja manustamise kordsus
12 tundi	HepB 1*
1–5 päeva	BCG
2 kuud	RV 1
3 kuud	DTaP-IPV-Hib-HepB 1 + RV 2
4,5 kuud	DTaP-IPV-Hib-HepB 2 + RV 3**
6 kuud	DTaP-IPV-Hib-HepB 3
1 aasta	MMR 1
1,5–2 aastat	DTaP-IPV-Hib-HepB 4
6–7 aastat	DTPa-IPV 5
12 aastat	HPV 1, 2***
13 aastat	MMR 2
15–17 aastat	dTap 6
Täiskasvanud (iga 10 aasta järel)	dT

Tähiste seletused:

HepB – B-virushepatiidi vaktsiin

BCG – tuberkuloosi vaktsiin

RV – rotaviirusnakkuse vaktsiin

DTaP-IPV-Hib-HepB – difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha, inaktiveeritud poliomüeliidi, *Haemophilus influenzae* tüüp b nakkuse ja B-virushepatiidi vaktsiin

MMR – leetrite, mumps ja punetiste vaktsiin

DTaP-IPV – difteeria, teetanuse, atsellulaarse läkaköha ja inaktiveeritud poliomüeliidi vaktsiin

HPV – inimese papilloomiviirusnakkuse vaktsiin

dTpa – difteeria, teetanuse ja atsellulaarse läkaköha vaktsiin

dT – difteeria ja teetanuse vaktsiin

* Üksnes HbsAg-positiivsetel või raseduse ajal B-virushepatiidi suhtes analüüsimate emadel sündinud riskirühma kuuluvad imikud

** Üksnes rotaviirusnakkuse viievalentse vaktsiini korral

*** Üksnes tütarlapsed. Esimese ja teise annuse vaheline intervall 6–13 kuud