

Karjamaale, liikumisteedele jms sattuvate väljaheidete taimedele omastatav lämmastik, fosfor ja kaalium

Nr	Looma liik, vanuse- või toodangurühm	Väljaheidete kogus ja toitelementide sisaldus									
		Kogus t/aasta	N		P		K		N kg/t	P kg/t	K kg/t
			%	kg	%	kg	%	kg			
1	Piimalehmad	3,8	50,0	11,0	60,0	3,0	90,0	14,9	2,9	0,8	4,0
2	Ammlehmad, lihaveised (üle 24 kuu)	4,6	50,0	19,8	60,0	2,3	90,0	35,8	4,3	0,5	7,8
3	Lehmvasikad (0...6 kuud)	0,4	50,0	1,4	60,0	0,2	90,0	2,5	3,3	0,5	5,9
4	Pullvasikad (0...6 kuud)	0,4	50,0	1,1	60,0	0,1	90,0	1,3	2,9	0,3	3,3
5	Lehmmullikad (6 kuud...poegimine)	3,7	50,0	9,6	60,0	2,2	90,0	14,4	2,5	0,6	3,8
6	Pullmullikad (6 kuud...realiseerimine)	2,3	50,0	6,8	60,0	1,3	90,0	7,3	2,9	0,6	3,2
7	Lammas koos kuni üheaastase tallega, muu lammas	1,3	50,0	4,6	60,0	0,9	90,0	14,4	3,7	0,7	11,5
8	Kits koos kuni üheaastase tallega, muu kits	0,7	50,0	2,8	60,0	0,6	90,0	5,8	3,8	0,8	7,9
9	Hobune koos kuni kuuekuuse varsaga, muu hobune	1,2	50,0	6,8	60,0	1,3	90,0	11,3	5,7	1,1	9,5