

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 2001. a määrus nr 288
 „Veekaitseenõuded väetise- ja sõnnikuhoidlatele ning
 siloladustamiskohtadele ja sõnniku,
 silomahla ja muude väetiste kasutamise ja hoidmise nõuded”
 Lisa 2

(muudetud sõnastuses)

Väetamise planeerimisel eelkultuuri järelmõju arvestamine

| | Lämmastiku normi | |
|---|------------------|---|
| | vähendada kg/ha | suurendada kg/ha |
| Eelkultuur | | |
| liblikõieliste juured ja ädal esimesel järelmõjuaastal | 25 | |
| liblikõieliste juured ja maapealse biomassi sisseküünd esimesel järelmõjuaastal sisseküntav liblikõieline alates nuppumise faasist (esimesed õied lahti) | 40 | |
| esimesel järelmõjuaastal küntakse külviaasta liblikõieline sisse enne talivilja külvi | 25 | |
| liblikõieliste katteviljaga külv | 20–30 | |
| hernes, uba | 10–15 | |
| teravilja põhk põllule jäetud | | 20–30 |
| teravili enne talivilja | | sügisel taliteraviljale kuni 30, talirapsile kuni 40 |
| Teised tegurid | | |
| väetiste hajuskülv (ühekordne kasutamine külvi eel) | | 15–20 |
| | | |