

Narkootilised ja psühhotroopsed ained, mille väljakirjutamisel ja apteegist retsepti alusel väljastamisel kehtivad koguselised piirangud

1. Maksimaalne ühe retsepti alusel väljastatav kogus:

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fenobarbitaal* | 50 tabletti 10 ampulli |
| Etüülmorfiin (ainsa toimeainena) | 1,0 g |
| Kodeiin (ainsa toimeainena) | 1,0 g |
| Kokaiin (ainsa toimeainena) | 0,1 g |
| Metüülfenidaat | 60 tabletti või kapslit |
| Amfetamiinid | 60 tabletti või kapslit |
| Naatriumoksübaat | 270 g |
| Tramadool | 12 g |

2. Bensodiasepiinide* või bensodiasepiinisarnaste ainetega (ATC rühmad N03AE, N05BA, N05CD, N05CF) ravi alustamisel Eestis turustatava väikseima toimeaine sisaldusega ravimpreparaadi maksimaalne väljakirjutatav kogus:

30 tabletti
20 ampulli
20 suposiiti
10 rektaaltuubi
25 ml tilku

3. Bensodiasepiinide* või bensodiasepiinisarnaste ainete (ATC rühmad N03AE, N05BA, N05CD, N05CF) korduval väljakirjutamisel 30 päeva jooksul ravimvormi kohta väljakirjutatav maksimaalne summaarne kogus:

60 tabletti (erandina flunitrasepaam 30 tabletti)
20 ampulli
20 suposiiti
10 rektaaltuubi
25 ml tilku

* Erandina võib fenobarbitaali, klonasepaami, klobasaami ja midasolaami epilepsia raviks välja kirjutada ja väljastada kuni kahekuulise ravi jaoks.