

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a
 määruse nr 53 "Õli- ja kiudtaimede seemne
 kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne
 tootmise ja turustamise nõuded¹"
 lisa 6
 põllumajandusministri 26. jaanuari 2011. a
 määruse
 nr 5 sõnastuses

[RT I, 01.02.2011, 3 – jõust. 04.02.2011]

SEEMNE KVALITEETI ALANDAVATE TAIMEKAHJUSTAJATE PIIRMÄÄRAD

Järjekorra number	Liik	Taimahaigus		
		Taimahaigusega saastunud seemnete maksimumprotsent (veerus kokku)		<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (maksimaalne sklerootsiumide või nende osade arv lisa 5 veerus 5 märgitud kaaluga proovis)
		hahkhallitus (<i>Botrytis</i> spp.)	kuivlaiksus (<i>Alternaria</i> spp.), laikpõletik (<i>Phoma exigua</i> var. <i>linicola</i>), linakõrbus (<i>Colletotrichum linicola</i>), linanärbumistõbi (<i>Fusarium</i> spp.)	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Raps (<i>Brassica napus</i> L. (partim))			10 ²
2.	Rüps (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs)			5 ²
3.	Harilik kanep (<i>Cannabis sativa</i> L.)	5		
4.	Harilik lina (<i>Linum usitatissimum</i> L. (partim))	5	5 ¹	
5.	Valge sinep (<i>Sinapis alba</i> L.)			5 ²

¹ hariliku lina puhul ei tohi lina laikpõletikuga (*Phoma exigua* var. *linicola*) saastunud seemnete arv olla suurem kui üks.

² valgemädaniku (*Sclerotinia sclerotiorum*) sklerootsiumide või nende osade arvu ei ole vaja kindlaks määrata, välja arvatud juhul, kui tekib kahtlus, kas veerus 5 kehtestatud tingimused on täidetud.